

## Carta de Inyecciones

### Instrucciones para el procedimiento:

1. Por favor de reportarse a su cita a la hora indicada.
2. Tiene que traer a alguien que le pueda manejar a su casa.
3. Por favor no consuma alimentos o bebidas por lo menos 6 horas antes de su procedimiento.
4. Traiga una lista de las medicinas que consume actualmente. Por favor tome la medicina para la presión, o alguna otra medicina esencial con un traguito de agua antes de su procedimiento.
5. Si está tomando anticoagulantes para la sangre, por favor consulte la siguiente tabla. Además se tendrá que hacer un exámen de laboratorio un día antes de su procedimiento.

### INSTRUCCIONES PARA ANTICOAGULANTES

MEDICAMENTO	DISCONTINUE	ANÁLISIS DE LABORATORIO
Warfarin/Coumadin	7 días	PT/INR
Clopidogrel/Plavix	7 días	tiempo de sangrado / PFA
ASA/Aspirin*	7 días	tiempo de sangrado / PFA
Eliquis	3 días	
Enoxaparin/Lovenox	10 días	
Ticlopidine/Ticlid	7 días	tiempo de sangrado / PFA
Tirofiban/ Aggrostat	7 días	tiempo de sangrado / PFA
Dipyridamole/Aggrenox	7 días	tiempo de sangrado / PFA
Pletal/Cliostazol	7 días	tiempo de sangrado / PFA
Pradaxa / Xarelto	2 días	
Vitamin E, Garlic, Ginseng, Fish Oil, Omega 3, Ginko, Ginger, Feverview	7 días	
Tumeric	3 días	

6. Si usted es diabético, por favor avísele a su doctor ó enfermera para obtener más información sobre la dieta e insulina.
7. Traiga ropa cómoda y zapatos con tacón bajo.
8. Por favor deje sus joyas y cosas con valor en casa.
9. Si llega tarde a su cita, hay probabilidad que su cita sea programada a una hora más tarde ó re-programada para otro día, según el horario del doctor.

## **Carta de Inyecciones Contado**

### **Durante su Procedimiento:**

1. Su procedimiento tendrá lugar en uno de nuestros cuartos especiales para procedimientos.
2. Si desea tener sedativo intravenoso, pero mantenerse consciente, tendrá una línea intravenosa. Se le mantendrá monitoreada la presión, el pulso y las respiraciones.
3. Su doctor determinará en qué posición le hará el procedimiento.
4. Su doctor ordenará un sedativo que le ayudará a reducir cualquier incomodidad y ansiedad que podría tener. No se usará anestesia general.
5. Su doctor le pondrá anestesia local en el punto de inyección.
6. Su procedimiento puede durar de 15 minutos hasta 60 minutos, dependiendo del tipo de procedimiento.
7. Su familia puede esperar en el cuarto de espera.

### **Después de su Procedimiento:**

1. Alivio para el dolor es variable. Puede ocurrir inmediatamente, pero también puede que tarde algunos días. Además puede que haya dolor en el sitio del procedimiento por algunos días. Algunas medicinas toman días para tomar efecto.
2. Usted estará en el cuarto de recuperación aproximadamente 30-60 minutos después de su procedimiento, dependiendo de qué sedativo se use.
3. Se seguirá monitoreando su presión, pulso y respiraciones durante su estado en el cuarto de recuperación.
4. Durante este tiempo, se le ofrecerán líquidos.
5. Puede que encuentre drenaje en el sitio de su procedimiento, pero esto es normal.
6. Puede que sienta más dolor en el sitio de la inyección hasta 48 horas después de su procedimiento.
7. Puede que sienta algunos otros efectos, pero el equipo de enfermeras repasará estos antes de ser dado de alta.
8. Cuando le hayan dado de alta, su doctor le dirá cuando regresar para una consulta.

\*Puede seguir tomando aspirina de bebé si su procedimiento es lumbar